

Patientenname: _____

Impfstoff: *Biontech*

Impftermin: 1. *Impfung:*_____ *Uhrzeit:*_____

2. *Impfung:*_____ *Uhrzeit:*_____

Jugendliche werden am ersten Impftermin nur im Beisein eines Erziehungsberechtigten geimpft!

Impfablauf Schutzimpfung gegen Covid-19

Bitte beachten Sie folgenden Ablauf:

1. **VOR IMPFTERMIN:** Sie bekommen von uns folgende Impfunterlagen. Diese müssen Sie soweit als möglich ausfüllen. Bringen Sie diese bitte zum Impftermin mit. Die Impfunterlagen enthalten:
 - ***Anamnesebogen*** : medizinische Vorgeschichte (soweit als möglich ausfüllen. Weitere Informationen siehe Rückseite des Informationsblattes!)
 - ***Einwilligungserklärung*** : ausfüllen und unterschreiben
 - ***Aufklärungsbogen***: ausfüllen und unterschreiben
 - **Impfung auch bei Blutverdünnern möglich:** *ASS, Marcumar, Xarelto/Eliquis/Lixiana: muss zur Impfung nicht abgesetzt werden.*
2. **ZUM IMPFTERMIN:**
 - **Bitte mitbringen:**
 - ausgefüllte Impfunterlagen!
 - Kugelschreiber
 - Versichertenkarte
 - Impfpass !!
 - **Impfdauer ca. 30min:**
Aufnahme-Aufklärung-Impfung-Nachbeobachtung.
(Die Nachbeobachtung verlängert sich von 15 auf 30min bei vorbekannten relevanten Allergien und bei der Einnahme von Blutverdünnern)

Bitte beachten Sie die Rückseite des Informationsblattes !!!

Wichtige Informationen zur Impfung:

A. Allergische Reaktion auf die Impfung

- Allergische Reaktionen sind sehr selten. Sollte eine allergische Reaktion dennoch auftreten, können wir Sie sofort behandeln
- Wichtige Informationen für den Arzt sind Medikamentenallergien allgemein und bei der Biontech-Impfung vor allem die seltene Allergie auf den Wirkstoff PEG (Polyethylenglycol), der in Kosmetika oder Abführmittel enthalten sein kann (z.B. Movicol)
- KEIN ERHÖHTES RISIKO besteht bei Hühnereiweißallergie, Asthma, Neurodermitis, Nahrungsmittelallergien, Heuschnupfen, Bienen-/Wespengiftallergien, Kontaktallergien wie Nickel

B. Impfreaktionen

- Impfreaktionen sind sehr häufig (Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gliederschmerzen, Fieber etc.) und treten bei den mRNA Impfstoffen (Biontech/Moderna) meist nach der 2. Impfung auf, bei den Vektorimpfstoffen (AstraZeneca/Johnson) nach der 1. Impfung (Details siehe Aufklärungsbogen anbei). Sie dauern meist 1-3 Tage. Bitte nehmen Sie erst fiebersenkende Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen ein, wenn sie Beschwerden haben und nicht vorher, da sonst die Impfwirkung abgeschwächt werden kann. Der Arzt/Ärztin wird das für Sie passende Medikament im Aufklärungsgespräch empfehlen.

C. Impfkomplicationen

- Schwere Impfkomplicationen sind sehr selten. Bei folgenden Beschwerden nach der Impfung sollten Sie aber sofort einen Arzt aufsuchen: Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Beinschwellungen, Bauchschmerzen, anhaltende Kopfschmerzen oder verschwommenes Sehen, oder Blutergüsse außerhalb des Verabreichungsortes der Impfung
- Für weitere Informationen verweisen wir auf die Aufklärungsbögen und das ärztliche Aufklärungsgespräch

Ihr